

Medikamenteninformation

14 Tage vor der Operation sollten Sie keine Aspirin-haltigen bzw. die Blutgerinnung beeinflussenden Medikamente einnehmen. Diese Substanzen erhöhen die Blutungsneigung und damit drastisch das Risiko einer Blutung während oder nach der Operation. Falls Sie aus medizinischen Gründen derartige Medikamente regelmässig einnehmen oder innerhalb von zwei Wochen vor dem Operationstermin eingenommen haben, bitten wir Sie, uns dies zu Ihrer eigenen Sicherheit mitzuteilen.

Zögern Sie bei Fragen oder Unklarheiten nicht, uns zu kontaktieren. Wir beraten Sie gerne!

FOLGENDE MEDIKAMENTE SIND ERLAUBT

PANADOL
DAFALGAN
DICLOFENAC/VOLTAREN
PONSTAN/MEFENACID
SPIRALGIN
PRETUVAL
NEO-CITRAN
NOVALGIN

FOLGENDE MEDIKAMENTE DÜRFEN SIE NICHT EINNEHMEN, DA DIESE DIE BLUTUNGSNEIGUNG ERHÖHEN

ALCACYL
ALKA SELTZER
AMAVITA ASS
AMAVITA Dolopirin C
ASASANTIN Ret
ASA-TABS
ASPEGIC
ASPERIVO
ASPIRIN
ASPIRIN CARDIO
ASPRO
ASS + C Sandoz
ASS CARDIO
Spirig AXANUM
CARDIAX ASS
CONTRA SCHMERZ
CLOPIDOGREL
CLOPIDRAX
DUOPLAVIN
INSTACYL
INDOMETACIN
INDOCID Retard Ret
INDOPHTAL
KARDEGIC
MARCUMAR
PLAVIX
TREUPEL
TIATRAL
Knoblauch- und Gingseng-/Ginkopräparate
TRAMAL